

SABA - β 2-mimétique à courte durée d'action

BPCO
Asthme



Non
remboursé

Airomir®

Salbutamol
[début : 2 min ; durée : 4-6 h]

MDI Autohaler

1-2 inhalations, max 16x/j

BPCO
Asthme



Non
remboursé

Novolizer Salbutamol®

Salbutamol
[début : 2 min ; durée : 4-6 h]

DPI Novolizer

1-2 inhalations, max 8x/j

BPCO
Asthme



Ventolin®

Salbutamol
[début : 2 min ; durée : 4-6 h]

MDI

1-2 inhalations, max 8x/j

SAMA - Anticholinergique à courte durée d'action

BPCO
Asthme



Atrovent®

Ipratropium
[début : 15 min ; durée : 4-6 h]

MDI

2-4 inhalations, max 12x/j

SABA + SAMA

BPCO
Asthme



Duovent®

Fénotérol + Ipratropium
[début : 5 min ; durée : 6 h]

MDI

1-2 inhalations, max 8x/j

LABA - β 2-mimétique à longue durée d'action

BPCO

Asthme



Foradil®

Formotérol

[début : 2 min ; durée : 12 h]

DPI Aerolizer

1-2 inhalations, 2x/j

BPCO

Asthme



Formagal®

Formotérol

[début : 2 min ; durée : 12 h]

DPI Axahaler

1-2 inhalations, 1-2x/j

BPCO

Asthme



Formoair®

Formotérol

[début : 2 min ; durée : 12 h]

MDI

1-2 inhalations, 2x/j

BPCO

Asthme



Novolizer Formoterol®

Formotérol

[début : 2 min ; durée : 12 h]

DPI Novolizer

1-2 inhalations, 2x/j

BPCO



Onbrez®

Indacatérol

[début : 5 min ; durée : 24 h]

DPI Breezhaler

1 inhalation, 1x/j

BPCO

Non
remboursé



Striverdi®

Olodatérol

[début : 5 min ; durée : 24 h]

MDI Respimat

2 inhalations, 1x/j

BPCO

Asthme



Serevent®

Salmétérol

[début : 15-30 min ; durée : 12 h]

MDI Evohaler

2 (max 4) inhalations, 2x/j

BPCO

Asthme



Serevent®

Salmétérol

[début : 15-30 min ; durée : 12 h]

DPI Diskus

1 (max 2) inhalation, 2x/j

Inhalateur mal utilisé ? Asthme mal contrôlé ? Exacerbations de BPCO ?
C'est le cas de près de la moitié de vos patients.

Vous pouvez faire quelque chose ... le BUM, vous participez !?

Pour plus d'informations sur les BUM Asthme et BPCO, consultez *MyAPB*.

LAMA - Anticholinergique à longue durée d'action

BPCO



Bretaris®

Aclidinium
[début : 30 min ; durée : 12 h]

DPI Genuair

1 inhalation, 2x/j

BPCO



Seebri®

Glycopyrronium
[début : 15 min ; durée : 24 h]

DPI Breezhaler

1 inhalation, 1x/j

BPCO



Non
remboursé

Spiriva®

Tiotropium
[début : 30 min ; durée : 24 h]

DPI Handihaler

1 inhalation, 1x/j

BPCO

Asthme



Non
remboursé

Spiriva®

Tiotropium
[début : 30 min ; durée : 24 h]

MDI Respimat

2 inhalations, 1x/j

BPCO



Tiotraxe®

Tiotropium
[début : 30 min ; durée : 24 h]

DPI Vertical-Haler

1 inhalation, 1x/j

BPCO



Incruse®

Uméclidinium
[début : 30 min ; durée : 24 h]

DPI Ellipta

1 inhalation, 1x/j

LABA + LAMA

BPCO



Duaklir®

Formotérol + Aclidinium
[début : 2 min ; durée : 12 h]

DPI Genuair

1 inhalation, 2x/j

BPCO



Ultibro®

Indacatérol + Glycopyrronium
[début : 5 min ; durée : 24 h]

DPI Breezhaler

1 inhalation, 1x/j

BPCO



Yanimo®
non
remboursé

Spiolto®/Yanimo®

Olodatérol + Tiotropium
[début : 5 min ; durée : 24 h]

MDI Respimat

2 inhalations, 1x/j

BPCO



Anoro®

Vilantérol + Uméclidinium
[début : 15 min ; durée : 24 h]

DPI Ellipta

1 inhalation, 1x/j

CSI - Corticostéroïde à inhaler

Asthme



Qvar®

Béclométasone

[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

MDI Authohaler

1-4 inhalations, 2x/j

Asthme



Budesonide Easyhaler®

Budésonide

[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Easyhaler

1-2 inhalations, 1-2x/j

Asthme



Novolizer Budesonide®

Budésonide

[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Novolizer

1-2 inhalations, 1-2x/j

BPCO

Asthme



Flixotide®

Fluticasone propionate

[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

MDI

1-2 inhalations, 2x/j

BPCO

Asthme



Flixotide®

Fluticasone propionate

[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Diskus

1-2 inhalations, 2x/j



Pour aider votre patient à utiliser correctement son inhalateur, vous trouverez également les instructions d'inhalation de chaque dispositif sur *MyAPB* et dans l'application web *PhiL*.



MY PUFF

MY PUFF, une appli simple qui aide votre patient à utiliser correctement son inhalateur

BPCO
Asthme



100µg : à la
demande
max 8x/j

Beclometasone/ Formoterol EG®

Béclométasone + Formotérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

MDI

1-2 inhalations, 2x/j

BPCO
Asthme



100µg : à la
demande
max 8x/j

Inuvair®

Béclométasone + Formotérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

MDI

1-2 inhalations, 2x/j

BPCO
Asthme



100µg : à la
demande
max 8x/j

Inuvair®

Béclométasone + Formotérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Nexthaler

1-2 inhalations, 2x/j

BPCO
Asthme



160µg : à la
demande
max 8x/j

Airbufo®

Budésonide + Formotérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Forspiro

1-2 inhalations, 1-2x/j

BPCO
Asthme



160µg : à la
demande
max 8x/j

Bufomix®

Budésonide + Formotérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Easyhaler

1-2 inhalations, 1-2x/j

BPCO



Symbicort®

Budésonide + Formotérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

MDI

2 inhalations, 2x/j

BPCO
Asthme



160µg : à la
demande
max 8x/j

Symbicort®

Budésonide + Formotérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Turbohaler

1-2 inhalations, 1-2x/j

Asthme



Zephyrus®

Budésonide + Salmétérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Axahaler

1 inhalation, 2x/j

BPCO
Asthme



Relvar®

Fluticasone furoate + Vilantérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Ellipta

1 inhalation, 1x/j

Asthme



Flutiform®

Fluticasone propionate + Formotérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

MDI

2 inhalations, 2x/j

Asthme



Flutisacombo®

Fluticasone propionate + Salmétérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

MDI

2 inhalations, 1-2x/j

BPCO
Asthme



Flutisamix®

Fluticasone propionate + Salmétérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Easyhaler

1 inhalation, 1-2x/j

CSI + LABA - suite

Asthme



Seretide®

Fluticasone propionate + Salmétérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

MDI

2 inhalations, 1-2x/j

BPCO

Asthme



Seretide®

Fluticasone propionate + Salmétérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Diskus

1 inhalation, 1-2x/j

Asthme



Atecura®

Mométasone + Indacatérol
[évaluer après 1 sem. d'utilisation]

DPI Breezhaler

1 inhalation, 1x/j

CSI + LABA + LAMA

BPCO

Asthme



Trimbow®

Béclométasone + Glycopyrronium
+ Formotérol
[début : 2 min ; durée : 12 h]

MDI

2 inhalations, 2x/j

BPCO



Trimbow®

Béclométasone + Glycopyrronium
+ Formotérol
[début : 2 min ; durée : 12 h]

DPI Nexthaler

2 inhalations, 2x/j

BPCO



Trixeo®

Budésonide + Glycopyrronium
+ Formotérol
[début : 2 min ; durée : 12 h]

MDI Aérosphère

2 inhalations, 2x/j

BPCO



Trelegy®

Fluticasone furoate +
Uméclidinium + Vilantérol
[début : 15 min ; durée : 24 h]

DPI Ellipta

1 inhalation, 1x/j

Asthme



Enerzair®

Mométasone + Glycopyrronium
+ Indacatérol
[début : 5 min ; durée : 24 h]

DPI Breezhaler

1 inhalation, 1x/j

Caractéristiques des différents dispositifs

		MDI (Metered Dose Inhaler)			DPI (Dry Powder Inhaler)										
		Aérosol doseur	Autohaler	Respimat	Aerolizer/ Axahaler	Breezhaler	Handihaler	Verticalhaler	Forspiro	Diskus	Easyhaler	Ellipta	Genuair/ Novolizer	Nexthaler	Turbohaler
															
Manipulation avant la 1 ^{ère} utilisation		+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+ ¹	-	+
Agitation avant usage		+ ²	+ ²	-	-	-	-	-	-	-	+ ³	-	-	-	-
Compteur de doses		+ ⁴	-	+	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+	+	+	+	+	+
Perception de la libération de la dose	Bruit	+	+	- ⁵	+	+	+	+	- ⁵	- ⁵	- ⁵	- ⁵	+	+	- ⁵
	Au niveau buccal	+	+	+	+	+	+	+	±	±	±	±	±	±	±
	Autre	Nuage	Nuage	Nuage	Gélule vide	Gélule vide	Gélule vide	Gélule vide	Bandelette dans la chambre latérale	-	-	-	Fenêtre de contrôle rouge	-	-
Double chargement de la dose		-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+
Ne pas couvrir les orifices d’aération (bouche/doigts)		-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-
Inspiration		Lente et profonde			Rapide et avec force										

1. Pas de manipulation avant la 1^{ère} utilisation du dispositif Genuair (Bretaris®, Duaklir®)

2. Il n'est pas nécessaire d'agiter ces aérosols doseurs avant usage : Atrovent®, Beclométasone/Formoterol EG®, Duovent®, Formoair®, Inuvair®, Qvar®, Trimbow®.

3. Agiter avant de préparer la dose. Ne pas agiter ou retourner l'inhalateur après chargement de la dose.

4. Ces aérosols doseurs ne disposent pas d'un compteur de doses : Atrovent®, Duovent®, Flixotide®, Flutisacombo®, Formoair®, Serevent®, Ventolin®.

5. Clic lors du chargement de la dose.