



STEEKKAART INTERACTIES GENEESMIDDELEN & ALCOHOL

Indicatie	Geneesmiddel(klasse)	Effect in combinatie met alcohol	Advies
Angina pectoris (hartkramp)	nitroglycerine (Minitran®, Trinipatch®), isosorbidedinitraat (Cedocard®), molsidomine (Coruno®, Corvaton®)	VERHOOGD RISICO DUIZELIGHEID EN BLOEDDRUKDALING	Beperk alcoholinname. Neem maatregelen op het risico op duizeligheid en vallen te verminderen.
ADHD en narcolepsie	centrale stimulantia	VERHOOGD EFFECT CENTRAAL ZENUWSTELSEL	Vermijd alcoholinname. Drink geen alcohol in geval van activiteiten die alertheid vragen (zoals het besturen van een voertuig) of bij ademhalingsproble men. CI difenhydramine: drink geen alcohol tijdens de behandeling
Allergie	sederende antihistaminica ! difenhydramine (Nustasium®)		
Bipolaire, persoonlijkheids- en gedragsstoornissen	antipsychotica		
Depressie	antidepressiva		
Epilepsie	anti-epileptica		
Hypertensie	centraal werkende antihypertensiva		
Kanker (immunotherapie)	thalidomide (Thalidomide BMS®)		
Kriebelhoest	antitussiva ! dihydrocodeïne, ethylmorfine		
Matig tot ernstige pijn	narcotische analgetica - (zwak) opioïde pijnstillers		
Nausea en braken	gastroprokinetica		
Overactieve blaas	propiverine (Mictonet®, Mictonorm®)		
Slaapstoornissen	benzodiazepines z-drugs		
Spierspasticiteit	baclofen (Lioresal®, Baclofen Viatrix®), tizanidine (Sirdalud®)		
Ziekte van Parkinson	anticholinergica met centrale werking dopamine-agonisten MAOB-inhibitoren		

STEEKKAART INTERACTIES GENEESMIDDELEN & ALCOHOL



Indicatie	Geneesmiddel(klasse)	Effect in combinatie met alcohol	Advies
Diabetes	antidiabetica	RISICO OP HYPOGLYCEMIE (alcohol kan bloedsuikerspiegel verlagen)	Beperkt alcoholinname
	metformine	LACTAATACIDOSE & RISICO OP HYPOGLYCEMIE	Vermijd alcoholinname, zeker in geval van risicofactoren
Hypertensie	verapamil (Isoptine®, Lodixal®)	ALCOHOL EFFECT WORDT VERSTERKT	Beperk alcoholinname. Drink geen alcohol in geval van activiteiten die alertheid vragen (zoals het besturen van een voertuig)
Alcoholafhankelijkheid	! disulfiram (magistraal)	ALCOHOLINTOLERANTIE	Drink geen alcohol tot 48u na het stopzetten van deze medicatie (ook metronidazol vaginaal) indien mogelijk
Infecties	antiparasitaire middelen: metronidazol (Flagyl®), ornidazol (Tiberal®) en niclosamide (Yomesan®)		
Pijn, koorts (en ontsteking)	Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen	VERSTERKT EFFECT MAAGKLACHTEN & VERHOOGD RISICO GASTRO INTESTINALE BLOEDINGEN	Vermijd alcoholinname. Drink geen alcohol bij maaglast
	niet opioïde analgetica- antipyretica		
	paracetamol	RISICO OP LEVERSCHADE	Beperk alcoholinname. Adviseer een interval van 8 uur tussen twee geneesmiddelinnamen bij dagelijks alcoholgebruik.
Psoriasis	! acitretine (Neotigason®)	TERATOGENITEIT	Cl acitretine: drink geen alcohol tijdens de behandeling en tot 2 maand na het beëindigen van de behandeling.
Reumatoïde artritis	methotrexaat (Ledertrexate®)	LEVERTOXISCH	Vermijd alcohol tijdens de behandeling. Isoniazide (Nicotibine®): drink geen alcohol tijdens de behandeling
Tuberculose	Tuberculostatica		
Trombo-embolische aandoeningen	vitamine K antagonisten*	VERSTERKT ANTISTOLLINGSEFFECT	Vermijd alcohol tijdens de behandeling.