GGG COPD: Hoe start ik dit op met een patiënt?

1. Identificeer de patiënt

Zoek in je apotheeksoftware naar patiënten uit de doelgroep die voldoen aan de inclusiecriteria.

Doelgroep

Patiënten met COPD die nood hebben aan een gepersonaliseerde begeleiding. Dat zijn patiënten die:

- therapieontrouw zijn en/of veel last hebben van kortademigheid.
- en/of frequent noodmedicatie/orale corticosteroïden/antibiotica gebruiken.
- en/of roken.

Inclusiecriteria

Elke ambulante patiënt met COPD die voldoet aan de volgende criteria:

- 50 jaar of ouder is (dit criterium vervalt als arts GGG voorschrijft).
- in behandeling is: minimaal 1 aflevering van een terugbetaalde langwerkende mono specialiteit (LABA of LAMA) OF combinatie (LABA, LAMA, ICS) in de afgelopen 12 maanden.

2. Informeer de patiënt

Licht het doel en het proces toe en verduidelijk de meerwaarde voor de patiënt. Informeer ook de huisarts en stem regelmatig af.

3. Vraag akkoord en schriftelijke toestemming

Vraag de patiënt zijn akkoord en schriftelijke toestemming voor voortgezette farmaceutische zorg als dit nog niet eerder is gebeurd.

4. Plan een afspraak in met de patiënt

- Spreek een datum en tijd af met de patiënt.
- Vraag de patiënt om inhalatoren mee te brengen.
- Stuur de patiënt een herinnering voor het gesprek.

5. Bereid het GGG voor en voer het uit

Per kalenderjaar zijn er **2 gesprekken** mogelijk:

- Informatiegesprek: **CNK5522-149**
  - Analyseer de therapietrouw op basis van het GFD.
  - Bespreek inhalatietechniek, medicatie en ziekte.
- Opvolggesprek: **CNK 5522-156**
  - Bespreek aandachtspunten en actiepunten uit het eerste gesprek.
  - Niet eerder besproken thema's, zoals levensstijl, komen aan bod.

Scan de QR-code voor meer info en nuttige documenten.

Apotheia
APOTHEKERS MAKEN MORGEN